

원숭이두창에 대해 알아야 할 것

DC | HEALTH
GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

원숭이두창은 무엇인가요?



원숭이두창은 천연두 과에 속하는 원숭이두창 바이러스에 의해 발생하는 희귀 질병입니다.

원숭이두창은 어떻게 확산되나요?



본 바이러스는 호흡기 비말과 직간접적인 피부 병변 접촉 (예를 들어, 침구 또는 개인 용품을 공유하거나 다루는 것 혹은 성행위)에 의해 퍼집니다.

원숭이두창의 증상은 무엇입니까?



열



부은 림프절



두통



오한



근육통



탈진



요통



피부 손상
(발진)

증상은 보통 바이러스에 노출이 된 후 7-14일 뒤에 나타나며, 5-21일 주기 안에 나타납니다.

원숭이두창은 어떻게 치료하나요?

발진과 피부 손상과 같은 원숭이두창의 증상을 가지고 있는 사람들은 위험 평가를 위해 개인 담당 의료진에게 연락해야 합니다. 이에 포함되는 사람은 다음과 같습니다:

- ▶ 원숭이두창 확산이 보고된 나라들에 여행한 자
- ▶ 비슷한 발진을 갖고 있는 사람이나 원숭이두창 진단이 확인 혹은 의심되는 사람과 접촉한 자, 또는
- ▶ 다른 사람과 밀접하거나 피부 접촉을 한 자