

Lo que necesita saber sobre la Viruela del Mono (Monkeypox)

¿Qué es la Viruela del Mono?



La Viruela del Mono es una enfermedad rara causada por el virus de la viruela del mono, que pertenece al mismo grupo de virus que la viruela.

¿Cómo se propaga la Viruela del Mono?



La Viruela del Mono (Monkeypox) se transmite a través de gotitas respiratorias y contacto directo o indirecto con lesiones cutáneas (*p. ej., compartir o manipular ropa de cama o artículos personales y contacto sexual*)

¿Cuáles son los síntomas de la Viruela del Mono (Monkeypox)?



Fiebre



Ganglios linfáticos inflamados



Dolor de cabeza



Escalofríos



Dolores musculares



Agotamiento



Dolor de espalda



Lesiones en la piel (erupción)

¿Cómo se trata la Viruela del Mono (Monkeypox)?

Las personas que puedan tener síntomas de Viruela del Mono, como erupciones o lesiones, deben comunicarse con su proveedor de atención médica para una evaluación de riesgos. Esto incluye a cualquier persona que:

- ▶ Viajó a países donde se han reportado casos de Viruela del Mono,
- ▶ Informe el contacto con una persona que tiene una erupción similar o recibió un diagnóstico de viruela del mono confirmada o sospechada, O
- ▶ Ha tenido contacto cercano o en la piel con otra persona

Los síntomas suelen aparecer de 7 a 14 días después de la exposición, con un rango de 5 a 21 días.