

# COMUNICADO DE PRENSA

2 de febrero de 2024

## DC advierte a los habitantes de una posible Exposición al sarampión

**CONTACTO:** Iván Ortiz Torres, (202) 641-3065, [ivan.torres@dc.gov](mailto:ivan.torres@dc.gov) |  
Melinda Salinas, (202) 934-0650, [melinda.salinas@dc.gov](mailto:melinda.salinas@dc.gov)

**WASHINGTON, DC** – El Departamento de Salud de DC (DC Health) ha sido notificado de un caso confirmado de sarampión en una persona que viajó a través de los aeropuertos del área de DC al regresar de un viaje internacional. Aunque la amenaza de transmisión es baja, DC Health está notificando a los habitantes del Distrito que estuvieron en estos lugares sobre su posible exposición. A continuación, se indican las fechas, horas y lugares donde se produjo la posible exposición:

- Terminal internacional del Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD)
  - 27 de enero entre las 6:00 am y las 9:30 am
- Claridge House en 2445 Lyttonville Rd, Silver Spring, MD 20910
  - 27 de enero entre las 7:30 am y las 10:00 am
  - 27 de enero entre las 6:00 pm y el 28 de enero a las 1:00 am
  - 29 de enero entre las 7:00 am y las 10:00 am
- Servicio de Urgencias del Suburban Hospital
  - 27 de enero entre las 7:00 pm y las 11:00 pm

### Síntomas del sarampión:

El sarampión es una enfermedad respiratoria muy contagiosa, viral y aguda, que suele afectar a los niños. Los pacientes son contagiosos desde 4 días antes de que aparezca la erupción hasta 4 días después de que aparezca. El virus se transmite principalmente por gotitas respiratorias o por gotitas en el aire en espacios cerrados cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede permanecer infeccioso en el aire y en las superficies hasta dos horas después de que una persona infectada abandone una zona. Los primeros síntomas son fiebre igual o superior a 101 grados Fahrenheit, secreción nasal, tos y ojos rojos y llorosos.

Si cree que estuvo en uno de estos lugares en el momento de la posible exposición, DC Health recomienda lo siguiente:

- Si nunca ha recibido una vacuna que contenga sarampión (ya sea la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola [MMR/SPR] o una vacuna sólo contra el sarampión, que está disponible en otros países), puede correr el riesgo de desarrollar sarampión. Cualquier persona que haya estado expuesta y corra el riesgo de desarrollar sarampión debe vigilar los síntomas durante 21 días.

- Si nota síntomas de sarampión, aíslese inmediatamente quedándose en casa y lejos de los demás. Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Llame antes de ir a la consulta de su proveedor de atención médica o a urgencias para notificarles que puede haber estado expuesto al sarampión y pídeles que llamen al departamento de salud. Esto ayudará a proteger a otros pacientes y al personal.
- Si ha recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión o nació antes de 1957, está protegido y no necesita tomar ninguna medida.
- Si padece alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunitario, consulte a su médico si tiene alguna duda o desarrolla algún síntoma.
- Si sólo ha recibido una dosis de la vacuna contra el sarampión, es muy probable que esté protegido y su riesgo de infectarse de sarampión por cualquiera de estas exposiciones es muy bajo. Sin embargo, para conseguir una inmunidad completa, consulte a su proveedor de atención médica sobre la posibilidad de recibir una segunda dosis de la vacuna.

\*\*\*

*El Departamento de Salud del Distrito de Columbia promueve la salud, el bienestar y la equidad en todo el Distrito y protege la seguridad de los habitantes, visitantes y empresarios de la capital de nuestro país.*